El Hijyeni Sağlamamız Gereken 5 Durum

Santral kateteri olan bir hastanın bakımında



Kateterin ve ilaç uygulama sisteminin herhangi bir manipülasyonundan **hemen önce**, örneğin:

2a. Kateter yerleştirme (steril eldiven giymeden önce), kateter çıkarma (temiz, steril olmayan eldiven giymeden önce), pansuman değiştirme, kan alma veya bu prosedürler için ilgili ekipmanı hazırlamadan önce
2b. Uygulama setine ve infüzyon sistemine erişme (açma)
2c. Kateter içine infüzyon için ilaçların hazırlanması

Aşağıdakiler gibi vücut sıvılarına maruz kalmayı gerektirebilecek herhangi bir işlemden **hemen sonra**:

3a. Kateterin takılması veya çıkarılması
3b. Kateterden kan alınması

Santral kateterler için önemli ek hususlar

1. **Endikasyon:** Santral kateterin endike olduğundan emin olun. Artık gerekmediğinde/klinik olarak endikasyon kalmadığında kateteri çıkarın.

2. **Takma/bakım ve çıkarma**

2.1 Femoral vene kateter takmaktan kaçının.

2.2 Yerleştirmeden önce kılavuzlara göre uygun bir antiseptikle cilt hazırlığı yapın.

2.3 Yerleştirme sırasında tam steril bariyer önlemleri alın (bone, cerrahi maske, steril eldivenler, steril önlük, büyük steril örtü).

2.4 Gazlı bez pansumanları 2 günde bir ve şeffaf örtüleri 7 günde bir değiştirin. Görünür şekilde kirlenme olduğunda pansumanları hemen değiştirin.

2.5 Kan, kan ürünleri ve yağ emülsiyonlarını uygulamak için kullanılan infüzyon setlerini yerel kılavuzlara uygun sürede değiştirin. Diğer setleri 72-96 saatte bir değiştirin.

2.6 Tüm kateter manipülasyonları için aseptik prosedürü (dokunmadan teknikle) kullanın.

3. En az 15 saniye boyunca alkol bazlı klorheksidin-glukonat ile bağlantı noktalarını ovalayın.

4. **İzleme:** Her gün kateterin takıldığı, çıkarıldığı ve pansuman değiştirildiği saat ve tarihi ve kateter cilt bölgesinin durumunu (görsel görünüm) kaydedin.

World Health Organization

GÜVENLİK İÇİN BİRLEŞİN: ELLERİNİZİ TEMİZLEYİN

REPUBLIC OF TÜRKİYE
MINISTRY OF HEALTH

© World Health Organization 2015. All rights reserved.
All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this poster. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.
WHO acknowledges, for their active participation in developing this material, the Infection Control Programme, University of Geneva Hospitals and Faculty of Medicine, Geneva, Switzerland.