



H İ D E R

TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ DERNEĞİ

5 ADIMDA

SANTRAL VENÖZ KATETER (SVK) İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ

2025 güncel rehber önerilerine göre hazırlanmıştır

Takımda

Bakımda

Yalnızca
uygun endikasyon varlığında takın.

1



Subklavyan bölgeyi kullanın.

2



El hijyenini sağlayın.

3



Maksimum
bariyer önlemlerini alın.
(steril önlük, steril eldiven, cerrahi
maske, bone ve steril büyük örtü)

4



Alkol içeren %0.5-2
klorheksidinle cilt antisepsisini
sağlayın. Antiseptiğin kurumasını
bekledikten sonra işleme başlayın.

5



Erişkinlerde ve >2 ay çocuklarda,
kateter giriş yeri örtüsü olarak,
klorheksidin içeren şeffaf örtüler
kullanın. * Hastaya günlük
klorheksidinli silme banyo
uygulayın.

1

Her işlemden
ÖNCE ve SONRA el hijyenini sağlayın.

2

Her türlü girişim öncesinde hub,
iğnesiz bağlantılar ve enjeksiyon
portlarını %70 alkol veya alkol içeren
klorheksidinle dezenfekte edin.

3

Kan, kan ürünleri, lipid
solüsyonları ve propofol için
kullanılanlar dışındaki sürekli
infüzyon setlerinin değişimi
7 günde bir olabilir.

4

Santral venöz kateter kullanım
gerekliliğini günlük olarak
değerlendirin.
Gerekmediğinde en kısa sürede
çıkarın.

5

* Kateter bölgesinde kan, sekresyon ve sızıntı varsa ilk günlerde steril gazlı bez kullanın, sonrasında klorheksidin içeren örtülere geçin. Klorheksidin içeren örtüleri 7 günde bir, steril gazlı bezleri 2 günde bir değiştirin. **Kan, sekresyon, sızıntı ve gevşeme olduğunda hemen değiştirin.** Kateter giriş yerini günlük olarak enfeksiyon bulguları yönünden kontrol edin ve kayıt altına alın.